

LES MEDICAMENTS DU SEVRAGE



BUPROPION LP (Zyban)

**Inhibiteur sélectif de la recapture neuronale des catécholamines
(noradrénaline et dopamine)**

**Indiqué en cas de dépendance à la nicotine.
Il n'est pas recommandé de l'associer aux TNS**

Durée de traitement : 7 à 9 semaines

BUPROPION LP (Zyban)

L'utilisation est néanmoins limitée en raison des **effets indésirables** :

- insomnies
- céphalées
- nausées
- sécheresse buccale
- réactions allergiques

Contre indications :

- troubles convulsifs
- tumeurs du système nerveux central
- sevrage d'alcool ou de benzodiazépines en cours
- anorexie ; boulimie
- trouble bipolaire
- insuffisance hépatique sévère

VARENICLINE (Champix)

Agoniste partiel des récepteurs nicotiques neuronaux à l'acétylcholine alpha 4 bêta 2

Aide à soulager les symptômes du manque et réduit les effets de plaisir liés au tabagisme

Durée de traitement : 12 semaines / Prix : 600 € pour 12 semaines

Ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte et les sujets de moins de 18 ans (AFSSAPS février 2007)

Effets indésirables : nausées (30 %), céphalées, rêves anormaux

Risque (possible) d'idées suicidaires et de tentatives de suicide (EMEA Agence Européenne du Médicament)

VARENICLINE (Champix)

1. Quelles sont les preuves de l'efficacité clinique ? Acceptables
2. À quel niveau apprécier l'efficacité ? Modestes
3. Quelles sont les preuves de la tolérance ? Acceptables
4. À quel niveau apprécier la tolérance ? Moyenne
5. Quel est le rapport bénéfice/risque ? Moyen
6. Dans quelle fraction de la population définie par l'AMM le médicament peut-il être utilisé avec la plus grande efficacité ? Minoritaire
7. Transposabilité des données des essais à la pratique. Incertain
8. Progrès thérapeutique ? Mineur