WEB DPC : PREVENTION DE LA CECITE DUE A L'ENDOPHTALMIE
AUDIT DE PRATIQUE : GRILLE DE RECUEIL DE DONNEES *APRES* LA PHASE COGNITIVE

NOM : **PRENOM :** **DATE :**

Cocher la case adéquate selon que l'indicateur est retrouvé ou pas dans le dossier-patient (PNC = Patient Non Concerné par cet indicateur)

ENONCE DES INDICATEURS	Patient 6			Patient 7			Patient 8			Patient 9			Patient 10		
	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC
Lors de la programmation d'une chirurgie oculaire, une allergie aux céphalosporines a été recherchée															
En ces de chirurgie oculaire, le respect des consignes pré opératoires de désinfection ont été respectées (douche antiseptique du patient, antisepsie pré-champ & champ opératoire avec temps de contact de l'agent antiseptique suffisant)															
En cas de chirurgie de cataracte, une prophylaxie antibiotique (céfuroxime en l'absence d'allergie aux céphalosporines) intra camérulaire a été mise en place															
En cas de chirurgie oculaire, un contrôle post opératoire a été effectué dans les 72 heures															
En cas de chirurgie oculaire, une antibioprophylaxie locale post opératoire a été prescrite															
Le patient opéré a été informé des symptômes évoquant une endophtalmie, de façon à consulter précocement															
En cas de douleur ou de baisse visuelle post opératoire, le patient a été revu en urgence															
En cas d'inflammation intra oculaire post opératoire, l'éventualité d'une endophtalmie a été envisagée															
En cas de suspicion d'endophtalmie, une prise en charge en urgence a été réalisée par une antibiothérapie intra vitréenne															
En cas de suspicion d'endophtalmie, des prélèvements intra oculaires ont été réalisés avant antibiothérapie (intra veineuse ou intra vitréenne)															