

WEB DPC : L'ENTORSE DU GENOU
AUDIT DE MODIFICATION DE PRATIQUE : GRILLE DE RECUEIL DE DONNEES AVANT LA PHASE COGNITIVE

NOM :

PRENOM :

DATE :

Cocher la case adéquate selon que l'indicateur est retrouvé ou pas dans le dossier-patient (PNC = Patient Non Concerné par cet indicateur)

ENONCE DES INDICATEURS	Patient 1			Patient 2			Patient 3			Patient 4			Patient 5		
	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC
L'interrogatoire a fait préciser le mécanisme exact du traumatisme															
Vous avez recherché à l'examen clinique une hémarthrose															
Vous avez recherché à l'examen clinique une laxité en valgus-varus															
Vous avez recherché à l'examen clinique un tiroir antérieur															
Vous avez systématiquement prescrit un bilan radiologique															
Si l'entorse était en phase aiguë, vous avez utilisé la cryothérapie															
Vous avez utilisé du paracétamol en première intention comme antalgique															
En cas d'atteinte ligamentaire périphérique médiale ou latérale, vous avez mis en place un traitement fonctionnel ¹															
En cas de mise en place d'une orthèse d'immobilisation stricte sans appui, vous avez instauré une prévention des complications thromboemboliques															
En cas de suspicion d'atteinte méniscale ou d'atteinte ligamentaire périphérique ou d'atteinte cartilagineuse et osseuse, vous avez prescrit une IRM															

¹ orthèse cruro-malléolaire rigide articulée