

**WEB DPC : APPORT DE L'HOMÉOPATHIE DANS LE SUIVI DE LA FEMME ENCEINTE**  
**AUDIT DE PRATIQUE CLINIQUE : GRILLE DE RECUEIL DE DONNÉES APRES LA PHASE COGNITIVE**

**NOM :**

**PRENOM :**

**DATE :**

**Cocher la case adéquate selon que l'indicateur est retrouvé ou pas dans le dossier-patient (PNC = Patient Non Concerné par cet indicateur)**

ENONCE DES INDICATEURS	Patiente 6			Patiente 7			Patiente 8			Patiente 9			Patiente 10		
	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC
Vous avez daté et déclaré la grossesse <sup>1</sup>															
Les groupages sanguin initial et au 3 <sup>ème</sup> trimestre (ABO phénotypes rhésus complet et Kell) avec Agglutinines irrégulières RAI <sup>2</sup> ont été faits															
Les dépistages initiaux toxoplasmose <sup>3</sup> , syphilis <sup>4</sup> , rubéole <sup>4</sup> et dépistage HIV ont été proposés															
Les examens cliniques mensuels <sup>5</sup> avec recherche de signes urinaires, de contractions utérines à partir du 3 <sup>o</sup> mois, et hauteur utérine à partir du 4 <sup>o</sup> mois ont été pratiqués															
Les échographies entre 11 & 13 SA <sup>6</sup> , entre 20 & 22 SA <sup>7</sup> et entre 31 & 32 SA <sup>8</sup> ont été réalisées															
Les maladies génétiques <sup>9</sup> (notamment les marqueurs sériques de la trisomie 21) ont été recherchées															
En cas de nausées et vomissements avec constipation, hémorroïdes et lourdeur de jambes chez une patiente triste, vous avez prescrit Sépia															
Pour préparer l'accouchement vous avez prescrit au moins 2 des remèdes suivants : Arnica, Caulophyllum, Actéa racémosa, Gelsémium															
Vous avez prescrit à votre patiente Caulophyllum en 5 CH à utiliser en cas de dystocie de démarrage															
En cas de patiente manquant de confiance en elle avec pleurs faciles améliorés par la consolation présentant une dilatation lente du col avec prise de poids et compulsions alimentaires, vous avez prescrit Pulsatilla															

<sup>1</sup> Avant la 15<sup>o</sup> SA, après diagnostic de grossesse et détermination du terme, pour ouverture des droits sociaux

<sup>2</sup> Si rhésus négatif ou transfusion récente ; si positif, identification et titrage obligatoire

<sup>3</sup> Sauf en cas de résultats écrits faisant considérer l'immunité comme acquise ; dépistage mensuel si négatif

<sup>4</sup> Sauf en cas de résultats écrits faisant considérer l'immunité comme acquise, datant de moins d'un an car ré-infestation possible ; dépistage mensuel si négatif

<sup>5</sup> Notamment tension artérielle, poids, glycosurie, albuminurie, bruits du cœur

<sup>6</sup> Couplée à la première consultation pour confirmation de la date de conception et établissement du terme

<sup>7</sup> Etude de l'écho-anatomie fœtale et identification d'éventuelles anomalies

<sup>8</sup> Diagnostic tardif des malformations pour une meilleure prise en charge périnatale

<sup>9</sup> Si antécédents familiaux et/ou personnels