

**WEB DPC : APPORT DE L'HOMÉOPATHIE DANS L'OSTÉOPOROSE DE LA FEMME MÉNOPAUSÉE**  
**AUDIT DE MODIFICATION DE PRATIQUE : GRILLE DE RECUEIL DE DONNÉES APRES LA PHASE COGNITIVE**

**NOM :**

**PRENOM :**

**DATE :**

**Cocher la case adéquate selon que l'indicateur est retrouvé ou pas dans le dossier-patient (PNC = Patient Non Concerné par cet indicateur)**

ENONCE DES INDICATEURS	Patient 6			Patient 7			Patient 8			Patient 9			Patient 10		
	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC
Age de survenue de la ménopause demandé															
Recherche d'antécédent de fracture périphérique survenue sans traumatisme majeur															
Antécédent de traitement inducteur d'ostéoporose recherché <sup>1</sup>															
Antécédent d'affection inductrice d'ostéoporose recherché <sup>2</sup>															
Recherche d'une éventuelle carence en calcium et/ou vitamine D															
Prise en compte des facteurs de risque fracturaire pour l'établissement du protocole préventif <sup>3</sup>															
Etablissement d'un protocole préventif abordant l'activité physique, la prévention des chutes, les règles hygiéno-diététiques et éventuellement le traitement médicamenteux															
Diagnostic d'ostéoporose établi par ostéodensitométrie quand une modification de la prise en charge de la patiente est envisagée															
Un traitement homéopathique a été institué en prévention d'ostéoporose															
Un traitement homéopathique a été institué en cas d'ostéopénie avérée															

<sup>1</sup> Corticothérapie systémique prescrite pour une durée d'au moins 3 mois consécutifs à une dose  $\geq 7,5$  mg/jour d'équivalent prednisone

<sup>2</sup> Hypogonadisme prolongé (incluant ovariectomie ou traitement prolongé par un agoniste de la Gn-RH), hyperthyroïdie évolutive non traitée, hypercorticisme, hyperparathyroïdie primitive, ostéogénèse imparfaite, ménopause précoce avant 40 ans

<sup>3</sup> DMO, âge, antécédent de fracture par fragilité, antécédent de corticothérapie systémique, antécédent de fracture de l'extrémité supérieure du fémur chez un parent du premier degré, masse corporelle < 19 kg/m<sup>2</sup>, ménopause précoce (avant 40ans), tabagisme, alcoolisme, troubles neuromusculaires et orthopédiques

