**WEB DPC : APPORT DE LA MESOTHERAPIE DANS LA PRISE EN CHARGE DE L'EPAULE DOULOUREUSE**
**AUDIT DE PRATIQUE : GRILLE DE RECUEIL DE DONNEES *AVANT* LA PHASE COGNITIVE**

**NOM :** **PRENOM :** **DATE :**

**Cocher la case adéquate selon que l'indicateur est retrouvé ou pas dans le dossier-patient (PNC = Patient Non Concerné par cet indicateur)**

| ENONCE DES INDICATEURS | Patient 1 | | | Patient 2 | | | Patient 3 | | | Patient 4 | | | Patient 5 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fait | Non fait | PNC | Fait | Non fait | PNC | Fait | Non fait | PNC | Fait | Non fait | PNC | Fait | Non fait | PNC |
| Vous avez exploré les amplitudes actives de l'épaule douloureuse pour établir un diagnostic | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vous avez exploré les amplitudes passives de l'épaule douloureuse pour établir un diagnostic | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vous avez tenu compte des territoires vasculo-nerveux pour établir le diagnostic étiologique de l'épaule douloureuse | | | | | | | | | | | | | | | |
| La douleur a été évaluée à l'aide d'une échelle visuelle analogique | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vous avez pratiqué une radiologie standard au titre du diagnostic initial de l'épaule douloureuse | | | | | | | | | | | | | | | |
| En cas de tendinopathie du supra-supinatus, vous avez utilisé la mésothérapie en première intention | | | | | | | | | | | | | | | |
| En cas d'utilisation de la mésothérapie dans une tendinopathie du supra-supinatus, vous avez employé un AINS | | | | | | | | | | | | | | | |
| En cas d'échec du traitement initial, vous avez prescrit IRM, arthro-scanner ou arthro-IRM | | | | | | | | | | | | | | | |
| En cas de rupture de la coiffe des rotateurs, vous avez utilisé la mésothérapie en association avec d'autres thérapeutiques avant d'envisager la chirurgie | | | | | | | | | | | | | | | |
| En cas de douleur de l'épaule en phase aigüe, vous avez pratiqué des séances à J1 & J8 & J15 (à 3 jours près) | | | | | | | | | | | | | | | |