WEB DPC :APPORT DE LA MESOTHERAPIE DANS LA PRISE EN CHARGE DE L'EPAULE DOULOUREUSE
AUDIT DE MODIFICATION DE PRATIQUE : GRILLE DE RECUEIL DE DONNEES *APRES* LA PHASE COGNITIVE

NOM : **PRENOM :** **DATE :**

Cocher la case adéquate selon que l'indicateur est retrouvé ou pas dans le dossier-patient (PNC = Patient Non Concerné par cet indicateur)

ENONCE DES INDICATEURS	Patient 6			Patient 7			Patient 8			Patient 9			Patient 10		
	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC
Vous avez exploré les amplitudes actives de l'épaule douloureuse pour établir un diagnostic															
Vous avez exploré les amplitudes passives de l'épaule douloureuse pour établir un diagnostic															
Vous avez tenu compte des territoires vasculo-nerveux pour établir le diagnostic étiologique de l'épaule douloureuse															
La douleur a été évaluée à l'aide d'une échelle visuelle analogique															
Vous avez pratiqué une radiologie standard au titre du diagnostic initial de l'épaule douloureuse															
En cas de tendinopathie du supra-supinatus, vous avez utilisé la mésothérapie en première intention															
En cas d'utilisation de la mésothérapie dans une tendinopathie du supra-supinatus, vous avez employé un AINS															
En cas d'échec du traitement initial, vous avez prescrit IRM, arthro-scanner ou arthro-IRM															
En cas de rupture de la coiffe des rotateurs, vous avez utilisé la mésothérapie en association avec d'autres thérapeutiques avant d'envisager la chirurgie															
En cas de douleur de l'épaule en phase aigüe, vous avez pratiqué des séances à J1 & J8 & J15 (à 3 jours près)															