WEB DPC : APPORT DE LA MESOTHERAPIE DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA LOMBALGIE
AUDIT DE MODIFICATION DE PRATIQUE : GRILLE DE RECUEIL DE DONNEES *APRES* LA PHASE COGNITIVE

NOM : **PRENOM :** **DATE :**

Cocher la case adéquate selon que l'indicateur est retrouvé ou pas dans le dossier-patient (PNC = Patient Non Concerné par cet indicateur)

ENONCE DES INDICATEURS	Patient 6			Patient 7			Patient 8			Patient 9			Patient 10		
	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC
Le diagnostic étiologique de la lombalgie a été recherché															
La douleur de la lombalgie a été évaluée à l'aide d'une échelle visuelle analogique															
Un examen clinique rigoureux a été réalisé															
En cas de lombalgie chronique sans signe d'alerte, aucun examen complémentaire n'a été prescrit															
En cas de lombalgie aigüe sans signe d'alerte, la mésothérapie a été utilisée en première intention															
En cas d'utilisation de la mésothérapie, un AINS a été utilisé															
En cas de lombalgie chronique, la calcitonine a été utilisée en mésothérapie															
En cas de contractures retrouvées, un myorelaxant a été utilisé en mésothérapie															
En cas de lombalgie chronique, la mésothérapie a été utilisée en association avec d'autres thérapeutiques (allopathie, ostéopathie,……)															
En cas de lombalgie chronique, la rééducation a été mise en place															