

WEB DPC : PREVENTION DE LA CECITE DUE A LA MYOPIE FORTE
AUDIT DE PRATIQUE : GRILLE DE RECUEIL DE DONNEES AVANT LA PHASE COGNITIVE

NOM :

PRENOM :

DATE :

Cocher la case adéquate selon que l'indicateur est retrouvé ou pas dans le dossier-patient (PNC = Patient Non Concerné par cet indicateur)

ENONCE DES INDICATEURS	Patient 1			Patient 2			Patient 3			Patient 4			Patient 5		
	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC	Fait	Non fait	PNC
Devant une myopie forte un fond d'œil a été réalisé															
Devant une myopie forte une rupture de la membrane de Bruch a été recherchée au pôle postérieur															
Devant une myopie forte les symptômes de déchirure ont été recherchés à l'interrogatoire															
En cas de décollement de rétine chez un myope fort, une consultation a été demandée en urgence chez un chirurgien															
Devant une baisse d'acuité visuelle chez un myope fort, un trou maculaire a été recherché															
Devant un trou maculaire chez un myope fort, le patient a été adressé à un chirurgien															
Devant un aspect étiré des vaisseaux rétiens au fond d'œil, une membrane épi-rétinienne a été recherchée															
Devant un schisis chez un myope fort, une déchirure a été recherchée															
Devant une déchirure avec traction vitréenne chez un myope fort, un avis chirurgical a été demandé															
Devant une néovascularisation maculaire chez un myope fort, un protocole de traitement par anti-VEGF a été mis en place															